



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica  
Servizio 7 Farmaceutica

Prot.n. 34333

Palermo, 23/4/14

**Oggetto:** Notifica delle decisioni della Commissione Regionale per il Prontuario Terapeutico Ospedaliero/Territoriale della Regione Sicilia.

***Ai Direttori Generali delle  
Aziende Sanitarie della Regione Sicilia  
LORO SEDI***

Nelle more della predisposizione del provvedimento di aggiornamento del PTORS, si notificano, in maniera sintetica, le decisioni della Commissione Regionale per il Prontuario Terapeutico Ospedaliero/Territoriale nella seduta del 10 Aprile 2014 in merito alle richieste di inserimento di nuove molecole nel PTORS:

ATC N07BB SODIO OXIBATO: La Commissione decide di eliminare le limitazioni imposte al Sodio Oxibato nella seduta del 21 Maggio 2013;

ATC J01DI02 CEFTAROLINA FOSAMIL: La Commissione **approva** l'inserimento in Prontuario con richiesta motivata su scheda AIFA per le polmoniti di comunità o su modello di scheda, di cui si allega fac-simile, per le infezioni della cute e dei tessuti molli;

ATC S01EE05 TAFLUPROST: il farmaco **non viene** inserito in Prontuario in quanto non presenta caratteristiche di innovatività, e ha un costo più elevato rispetto al latanoprost già in PTORS;

ATC S01LA05 EYLEA: la Commissione stabilisce l'inserimento di Eylea in PTORS con le stesse disposizioni previste per gli altri farmaci per la DMLE (Centri prescrittori);

ATC A10BH05 LINAGLIPTIN La Commissione approva l'inserimento in PTORS;

ATC A10BD11 LINAGLIPTIN+METFORMINA: La Commissione approva l'inserimento in PTORS;

ATC A10BD10 SAXAGLIPTIN+METFORMINA: La Commissione approva l'inserimento in PTORS;

ATC A10BX10 LIXENATIDE: La Commissione approva l'inserimento in PTORS;

ATC M09AB02 CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM: La Commissione approva l'inserimento in PTORS;

ATC: B01AF02 APIXABAN

Viene approvata l'estensione delle indicazioni pertanto APIXABAN è in PTORS per la prevenzione degli eventi trombo embolici venosi (TEV) nei pazienti sottoposti a intervento chirurgico di sostituzione d'anca o ginocchio e per la prevenzione dell'ictus e embolia sistemica nei pazienti con fibrillazione atriale non valvolare con uno o più dei seguenti fattori di rischio: precedente ictus, attacco ischemico transitorio o embolia sistemica, frazione di eiezione del ventricolo  $sn < 40\%$ , classe NYHA  $\geq 2$ , età  $\geq 75$  anni, oppure  $\geq 64$  anni associata a coronaropatie diabete mellito o ipertensione. La prescrizione è riservata alle UU.OO. formalmente riconosciute, pubbliche e private accreditate, di Cardiologia, medicina interna Neurologia, Geriatria, Ematologi di Centri di Trombosi ed emostasi, nonchè da parte degli specialisti delle stesse branche convenzionati interni. La dispensazione deve avvenire in forma diretta da parte dell'ASP di residenza del paziente previa consegna della stampa del piano terapeutico online, corredato nel caso della NVAF, dal referto dell'ecocardio e, in relazione ai fattori di rischio, una delle seguenti certificazioni:

Certificazione della Classe NYHA  $\geq II$ ;

Certificazione di diabete;

Certificazione di ipertensione;

Attestazione di avvenuto ictus;

D'Ordine del Presidente della Commissione

Dott. Antonio Lo Presti

